

Dr Nicola CORIGLIANO

*Ancien Chef de Clinique - Assistant des Hôpitaux de Paris
Membre de la Société Française et Francophone
de Chirurgie de l'Obésité*

**CHIRURGIE GENERALE ET DIGESTIVE
CHIRURGIE DE L'OBESITE
CHIRURGIE ROBOTIQUE**

RPPS : 10004040282
N.AM.:75 1 94999 1



www.corigliano-chirurgie.com



CLINIQUE MONT-LOUIS
Médecine, Chirurgie

8-10, rue de la Folie Regnault
75011 PARIS
Tél. : +33 (0)1.43.56.56.56

FICHE POSTOPERATOIRE

Madame, Monsieur,

Vous avez été opéré(e) d'une cholécystectomie coelioscopique par le Docteur CORIGLIANO.

Le soir de l'intervention vous pouvez manger léger (soupe, yaourt, compote). Les repas riches en graisses sont à éviter.

Une sensation de ballonnement lié aux gaz de la coelioscopie peut durer jusqu'au lendemain de l'intervention et ne constitue pas une complication. Des douleurs aux épaules peuvent également se manifester et disparaissent normalement en quelques jours.

Vous pouvez retirer les pansements et prendre une douche dès le lendemain de l'opération en ayant le soin de bien sécher les plaies en tamponnant avec un linge sans frotter.

Après avoir retiré les pansements vous verrez que les plaies sont recouvertes de petites bandes collantes (Stéristrips) qui permettent de les surveiller.

Une dizaine de jours après l'intervention, lorsque les bandes collantes commenceront à se détacher, vous pourrez finir de les décoller. Des fils résorbables sont utilisés pour la cicatrisation de la peau. Il ne sera donc pas nécessaire de les enlever, sauf en cas de prescription spécifique.

L'immersion prolongée de la plaie dans l'eau (bain, piscine) doit être évitée pendant les 2 à 3 semaines qui suivent l'intervention.

Il n'y aura pas de régime à suivre.

Vous pourrez marcher, monter les escaliers et conduire dès le lendemain de l'intervention.

Les seules précautions à prendre sont de ne pas soulever de poids lourds ni de faire de sport pendant un mois.

Les cicatrices seront indurées et surélevées pendant plusieurs semaines ce qui est normal. Il est possible de constater la présence d'une ecchymose (un bleu) autour de la cicatrice.

Si vous avez de la fièvre ou des fortes douleurs abdominales ou les cicatrices deviennent rouges, anormalement chaudes et douloureuses, contactez le Dr CORIGLIANO par l'intermédiaire de son secrétariat (07.60.73.81.27) ou de la Clinique (01.43.56.56.56) en appelant de préférence dans la matinée.